


Sind Ihre Kinder ausreichend geschützt?

Meningokokken-Serogruppen und -Impfungen im Überblick



Meningitis
bewegt.

Auslöser für Infektionen:



Mit **59 %** sind **Meningokokken B** der häufigste Auslöser einer Meningokokken-Infektion. Es folgt die Serogruppe **C mit 18 %**. Sehr selten sind Infektionen durch die Serogruppen **A, W₁₃₅ und Y, die gemeinsam 23 %** erreichen.*

Impf-Empfehlungen:

Meningokokken B

STIKO-Empfehlung ab dem zweiten Lebensmonat bei eingeschränkter Immunfunktion oder bei engem Kontakt zu einem Meningokokken-Erkrankten. Öffentliche Empfehlung für alle Kinder ab dem zweiten Lebensmonat in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern sowie in Schleswig-Holstein, Hamburg, Brandenburg, Thüringen und Bayern. Die allgemeine STIKO-Empfehlung steht noch aus.

Meningokokken C

STIKO-Empfehlung für alle Kinder ab dem zwölften Lebensmonat.

Meningokokken A, W₁₃₅ oder Y

STIKO-Empfehlung bei gesundheitlicher Gefährdung oder bei Reisen in Risikogebiete.

*RKI SurvStat@RKI 2.0: www.survstat.rki.de; Abfragedatum: 17.01.2018